

هفتادمین کنگره تغذیه ایران

کنفرانس ملی‌السنجی مادر

(دشت ۱۱ الی ۱۴ شهریور ماه ۱۳۸۱)

عنوان: بررسی نوع شیر مصرفی کودکان زیر یکسال تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان و ارتباط آن با وضعیت منحنی رشد آنان و سطح تحصیلات مادر
نویسنده‌گان: پاکنهاد ز.^{*}، کریم آباده ن.^{*}، نوریان م.
آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه تغذیه دانشکده بهداشت

هدف: این مطالعه با هدف بررسی نوع شیر مصرفی کودکان زیر یکسال تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان و ارتباط آن با سیر منحنی رشد و سطح تحصیلات مادر صورت پذیرفت.

روش بررسی: تعداد ۵۲۱ کودک زیر یکسال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند. متغیرهای مورد انتظار شاخصهای آنژروپومنتریک (قد، وزن)، نوع شیر مصرفی در بلوغ تولد، سطح تحصیلات مادریوده که با استفاده از اطلاعات موجود در پرونده‌ها جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز گردید.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که ۴٪ از این کودکان از شیر مادر، ۱۲٪ از شیر خشک و ۱۶٪ از شیر گاو تغذیه می‌گردند. بررسی وضعیت منحنی رشد قیز نشان داد که ۶۳٪ بین صدی ۳۰ و ۵۰ و ۲۳٪ بین صدی ۵۰ و مابقی زیر صدی ۳ بوده اند. بین نوع شیر مصرفی و وضعیت منحنی رشد ارتباط معنی دار وجود داشت ($P < 0.01$). به طوری که از ۳۵ نفری که بین صدی ۳۰ و ۵۰ بودند ۲۴ نفر (۷۹٪) از شیر مادر تغذیه می‌گردند. همچنین از ۱۸۰ نفری که بالای صدک ۵۰ بودند ۱۲۳ نفر (۷۳٪) از شیر مادر تغذیه می‌گردند. ارتباط بین نوع شیر مصرفی و سطح تحصیلات مادر اگرچه از نظر آماری معنی دار نبود اما با افزایش سطح تحصیلات مادر، موارد استفاده از شیر مادر افزایش یافته بود.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده من نوان نتیجه گرفت که میزان تحصیلات مادر مبنای در انتخاب نوع شیر مصرفی نوزاد و در نتیجه روند رشد کودک تأثیر مثبت داشته باشد.