

حاملگی خارج رحمی و مرگ و میر مادر

نویسنده‌گان: شهرزاد قلمکاری نژاد^۱، شادی گلی^۲

۱- دانشجوی کارشناسی مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

۲- مرکز تحقیقات توسعه علوم پرستاری و مامایی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

مقدمه:

حاملگی خارج رحمی یکی از عوارض شایع مامایی است که در ۲درصد حاملگی‌ها این عارضه ایجاد می‌شود. در این حالت حاملگی در محلی غیر از حفره رحم ایجاد می‌شود و در ۹۵٪ موارد حاملگی خارج رحمی در لوله‌های رحمی ایجاد می‌شود. میزان مرگ و میر در این عارضه حدود ده برابر زیمان واژنال می‌باشد. این میزان ۵۰ برابر میزان مرگ و میر در موارد القاء سقط می‌باشد.

مواد و روش‌ها:

این مطالعه مورثی با استفاده از ۲۰۰ مقاله ایندکس شده در سایت‌های معتبر Pubmed, Elsivier, direct Science, و Google Scholar بدست آمده است.

یافته‌های:

شیوع حاملگی خارج رحمی به علت استفاده بیشتر از روش‌های کمک باروری و افزایش عفونت‌های منتقله از راه جنسی در حال افزایش است. حاملگی خارج رحمی شایع‌ترین علت مرگ و میر سه‌ماهه اول بارداری بوده و باعث کاهش شانس حاملگی موفق بعدی می‌گردد. در گزارشی از سازمان بهداشت جهانی ۹/۴ در صد مرگ مادران ناشی از حاملگی خارج رحم بوده است. در دوران باروری تشخیص و درمان صحیح حاملگی خارج رحمی به منظور حفظ باروری و کاهش شیوع حاملگی خارج رحمی بعدی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با استفاده از سونوگرافی ترانس واژنال و تست β -HCG می‌توان جهت تشخیص زودرس این عارضه اقدام نمود. در مطالعه‌ای توسط مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها (CDC) در سال ۲۰۱۲ در زمینه حاملگی خارج رحمی، افزایش مرگ و میر مادران با دو ریسک فاکتور مصرف مواد مخدر و تاخیر در دریافت مراقبت‌های بهداشتی مرتبط بود. در این مطالعه نشان داده شد نرخ مرگ و میر حاملگی خارج رحمی در ایالات متحده از ۱۱.۵ نفر در هر صدهزار تولد زنده در ۱۹۸۴-۱۹۸۰ به ۰.۵ در ۲۰۰۷-۲۰۰۳ کاهش یافته است. در مطالعه دیگری توسط Orazulike NC و همکاران (۲۰۱۳) در زمینه تشخیص حاملگی خارج از رحم بیان گردید که عوامل متعددی از جمله تشخیص اشتباه و شکست به درمان از علل مساعد کننده مرگ و میر مادران می‌باشند. اگرچه پیشرفت‌های اخیر در تصویربرداری توانسته است شیوع حاملگی خارج رحمی پاره شده را کاهش دهد.

نتیجه‌گیری:

تلاش برای جلوگیری از مرگ و میر مادر متعاقب حاملگی خارج از رحم نیازمند کسب اطمینان از دسترسی سریع مادر به مراقبت‌های بارداری، ترویج آگاهی در مورد تست اولیه بارداری و خطر حاملگی خارج رحمی، بالا بردن آگاهی عمومی در مورد خطرات بهداشتی سوء مصرف مواد به ویژه در دوران بارداری، تشخیص سریع حاملگی خارج رحمی و درمان مناسب و به موقع آن می‌باشد.

واژگان کلیدی: حاملگی خارج رحم، مرگ و میر مادر، تشخیص زودرس