



## بررسی تأثیر بارداری در زنان مبتلا به MS

شیراز رستمی راد - وجیهه توربخش

کلمات کلیدی:

مولتیپل اسکلروزیس MS، زنان باردار

### مقدمه و هدف:

MS یک بیماری خود ایمن می‌باشد که بر سیستم عصبی مرکزی اثر می‌گذارد. بیماری بیشتر در سنین 20-40 سالگی شروع می‌شود که البته برخی نتایج در ایران ابتلا در سنین زیر 20 سال را نیز نشان داده‌اند و اغلب زنان را درگیر می‌کند (2 برابر مردان). از آنجا که سن ابتلا با سن باروری زنان یکسان است این بیماری می‌تواند در یک زن باردار مبتلا به MS اختلالاتی ایجاد نماید. هدف از انجام این پژوهش تعیین تأثیر بارداری در زنان مبتلا به MS می‌باشد.

روش کار: مقاله مروری فوق یک مطالعه کتابخانه‌ای بر روی آخرین و جدیدترین مقالات موجود در مجلات مرتبط (مجلات معتبر پزشکی و مجلات انجمن MS اصفهان) و همچنین با استفاده از مقالات اینترنتی و مقالات موجود در کتب مربوطه به موضوع فوق می‌باشد که پس از جمع‌آوری حدود 20 مقاله از بین آنها 10 مقاله انتخاب گردید و با بررسی آنها بهترین مطالب در ارتباط با مقاله فوق برداشت شد.

نتایج و یافته‌ها: بارداری زنان مبتلا به بیماری MS اثرات کلینیکی طولانی مدت برای آنها ایجاد نمی‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد زنانی که بیماری MS دارند با مراقبت ویژه از مادر شدن محروم نمی‌شوند و مدرکی مبنی بر این که بیماری MS بر قدرت باروری اثر بگذارد یا منجر به سقط جنین